Involucro per incontinenza maschile



QuickChange™

Profilo del paziente

Pazienti maschi non ambulanti e incontinenti

Esempi di casi d'uso

- Pene ritratto/scroto ingrossato
- Pazienti con deterioramento della pelle
- Pazienti con catetere permanente
- Ventilazione aperta con assorbenti protettivi



Prevenzione delle infezioni

Utilizzare in combinazione con un catetere permanente per aiutare a ridurre il rischio di infezione.



Alternativa al catetere

Utilizzare dove i cateteri esterni sono difficili da usare.



Mantenere l'integrità della pelle

Mantenere l'urina lontana dalla pelle senza usare adesivi.



Minimizzare il contatto tra il personale e il paziente

Controllo e cambio in 60 secondi!




Forma unica ----

Progettato per adattarsi a tutti i tipi di anatomia e non richiede rotolamento del corpo per l'applicazione o la rimozione.


Nucleo superassorbente - -

Assorbe l'umidità e il liquido prima che si accumuli sulla pelle o sulla biancheria


Come viene applicato QuickChange



 Posizionare il lato bianco verso l'alto, il bordo arrotondato verso la testa e le due alette verso le gambe.



2. Piegare la linguetta appuntita sopra il pene a 45° e poi piegare la linguetta diritta sopra.



3. Con due dita, pizzicare la chiusura a gancio e la linguetta interna insieme per assicurare il fissaggio.




Scansionare il codice QR per applicazioni aggiuntive e informazioni.


Applicazioni QuickChange[™]

QUICKCHANGE URINE MANAGEMENT WRAP

Pene standard (Utilizzare 1 involucro)




1. Posizionare il lato bianco verso l'alto, il bordo arrotondato verso la testa e le due alette verso le gambe.




 Piegare la linguetta appuntita sopra il pene a 45° e poi piegare la linguetta diritta sopra.

 Con due dita, pizzicare la chiusura a gancio e la linguetta interna insieme per garantire il fissaggio.


Pene retratto/Edema scrotale medio (Utilizzare 1 involucro)



 Posizionare il lato bianco verso l'alto, il bordo arrotondato verso la testa e le due alette verso le gambe.




2. Far scivolare la linguetta appuntita sotto lo scroto, sollevare verso l'alto e poi piegare la linguetta diritta sopra.




3. Pizzicare la chiusura a gancio e la linguetta interna insieme per garantire il fissaggio.

Edema scrotale grande (Utilizzare 2 involucri)




 Posizionare due involucri intorno allo scroto e al pene; fissare insieme una linguetta diritta e una appuntita.




2. Tirare gli altri due lembi verso l'interno, creando una forma a ciotola sotto lo scroto e pizzicare insieme per garantire il fissaggio.

▲ Uso scorretto




Non arrotolare in una forma a cono/imbuto stretta.


Bariatrico (Utilizzare 2 involucri)



 Posizionare sotto lo scroto, tirare verso la testa per garantire il contatto, infilare tra le gambe per raccogliere il liquido.



2. Posizionare il secondo involucro e piegarlo a metà verso il basso e in larghezza, assicurandosi che il centro sia adeguatamente coperto.



<u>Non lasciare</u> il QuickChange puntato verso le gambe.